

Angine à streptocoque
du groupe A ?



Test de Diagnostic Rapide

angine

Le complément indispensable
à votre examen clinique



SI ON LES UTILISE A TORT,
ILS DEVIENDRONT MOINS FORTS.



L'Assurance
Maladie

> Pourquoi faire un TDR angine ?

- > **Aucun signe clinique ni symptôme ne sont spécifiques des angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA).**


Complément indispensable de l'examen clinique, le **TDR** angine confirme l'étiologie à SGA. Il réduit le risque de passer à côté de cette angine bactérienne.*

Fiabilité du **TDR** angine : **sensibilité > 90 %, spécificité > 95 %.**

- > **Utiliser les antibiotiques de manière ciblée, c'est préserver leur efficacité.** Le **TDR** angine permet de réserver les antibiotiques aux angines à SGA et évite ainsi de prescrire ces médicaments inutilement.

> Pour quel patient ?**

Devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée



Pas de nécessité de pratiquer un **TDR** angine, ni de traiter par antibiotiques chez :

- > Enfant < 3 ans (angine à SGA rare, Rhumatisme Articulaire Aigu exceptionnel)
- > Adulte + score de Mac Isaac < 2

* Humair, Antonini Revaz, Bovier *et al.* Management of Acute Pharyngitis in Adults. Arch Intern Med 2006;166:640-644.

** AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et l'enfant. Recommandations. Octobre 2005.

*** Sans facteur de risque de RAA (Rhumatisme Articulaire Aigu), ce résultat ne justifie pas de contrôle supplémentaire systématique par culture, ni de traitement antibiotique.



> Le TDR angine, un outil intégré à la consultation

Au début de l'examen, devant des signes cliniques d'angine érythémateuse ou érythémato-pultacée :



1 Prélèvement



1 minute

Mise en contact du prélèvement avec les réactifs



5 minutes

Poursuite de la consultation en attendant le résultat
Immersion du test



4 Lecture du résultat en fin de consultation

Dans la plupart des cas, le **TDR** angine se révèle négatif car les angines sont d'origine virale dans :

- 75 à 90 % des cas chez l'adulte,
- 60 à 75 % chez l'enfant.

En quelques minutes, avec le **TDR** angine, vous contribuez à préserver l'efficacité des antibiotiques.

Angine à streptocoque du groupe A ?

L'Assurance Maladie se mobilise pour préserver l'efficacité des antibiotiques et lutter contre le développement des résistances bactériennes.

Elle met gratuitement des **TDR** angine à la disposition des médecins libéraux généralistes, pédiatres et ORL.

> Comment recevoir gratuitement vos **TDR** angine ?

> Commandez sur internet : <https://espacepro.ameli.fr/>

The screenshot shows the 'Espace pro' interface for 'MÉDECINE GÉNÉRALE'. The 'Commandes' section is highlighted with an orange circle, containing the following links: 'Commander des imprimés', 'Historique des commandes', 'Formulaires en ligne', and 'Test de diagnostic rapide angine'. A callout bubble with an orange border and white background contains the text 'Nouveau ! + simple + rapide'.

> Ou commandez sur papier :

- Demandez un **bon de commande pré-identifié** au correspondant **TDR** de votre Caisse ou à votre Délégué de l'Assurance Maladie.
- Ou faites votre demande sur **papier libre** ou sur **ordonnance** comportant votre nom, votre adresse professionnelle, votre identifiant et votre spécialité. Indiquez clairement le nombre de boîtes de **TDR** angine souhaitées (20 tests par boîte) ainsi que l'adresse de livraison, si elle diffère de votre adresse professionnelle. A envoyer au correspondant **TDR** de votre Caisse ou à remettre à votre DAM, datée et signée.



SI ON LES UTILISE A TORT,
ILS DEVIENDRONT MOINS FORTS.

 l'Assurance
Maladie